

1. Objectif du test :

Recherche d'un foyer d'infection, identification de la bactérie mise en jeu et antibiogramme éventuel

2. Matériel à utiliser :

Écouvillons avec milieu de transport fournis par le laboratoire (si possible prélever au minimum 2 écouvillons)

3. Protocole de recueil :

- Le recueil est fait de préférence avant le début d'un traitement antibiotique
- Réaliser 2 écouvillonnages du site concerné
- Faire un prélèvement par « grattage »
- En ce qui concerne le prélèvement de gorge, respecter les conditions suivantes :
 - Au niveau des zones inflammatoires ou nécrotiques
 - A la périphérie des fausses membranes, sur les amygdales
 - Éviter de toucher la langue, la luette et la paroi postérieure du pharynx
- Identifier le prélèvement : Nom, Prénom et Date de naissance sur l'échantillon

4. Conservation :

Amener dès que possible le prélèvement au laboratoire. A défaut, il se conserve 24h sur milieu de transport. Si le prélèvement a été réalisé sur un écouvillon sans milieu de transport, l'échantillon doit être amené dans les 2h au laboratoire.

Le milieu de transport assure la stabilité à température ambiante.

5. Informations à fournir :

- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Traitement antibiotique éventuel
- Site concerné

6. Remarque :

Sites de prélèvement concernés : oreille, nez, gorge, œil, bouche